

Equiset®

Estratto di Equiseto per il controllo della peronospora della vite e delle orticole

Equiset®, è una sostanza di base autorizzata ai sensi dell'art.23 del Reg. (CE) 1107/2009. Possiede effetto elicitore che stimola le difese naturali della pianta ed interviene nel controllo degli agenti patogeni.

COMPOSIZIONE

Equisetum arvense 0,2%

FORMULAZIONE

Concentrato
Dispersione (DC)



Flacone: 1 L
Cartone: 12x1 L
Pallet: 792 L



Tanica: 5 L
Cartone: 4x5 L
Pallet: 1000 L

Visita
la pagina
prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (ml/ha)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
MELO, PESCO	Ticchiolatura (<i>Venturia inaequalis</i>)	300-500	Applicazioni estive Dalla comparsa dei mazzetti floreali alla caduta dei fiori (BBCH 53-67)	2-6 applicazioni fogliari Ogni 7 giorni	Non previsto
	Oidio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)				
	Bolla (<i>Taphrina deformans</i>)				
VITE	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)		Applicazioni primaverili-estive Dal primo sviluppo fogliare fino al completo sviluppo delle infiorescenze (BBCH 10-77)		
	Oidio (<i>Erysiphe necator</i>)				
CETRIOLO	Oidio (<i>Podosphaera xanthii</i>)		Da stadio di 9 foglie sullo stelo principale fino a 9 o più germogli laterali visibili (BBCH 19-49)	2 applicazioni fogliari Ogni 3-4 giorni	15
	Funghi del suolo (<i>Pythium spp.</i>)				
POMODORO	Alternaria (<i>Alternaria solani</i>)		Applicazioni estive durante l'emergenza fiorente (BBCH 51-59)	2 applicazioni fogliari Ogni 14 giorni	15
	Septoria (<i>Septoria lycopersici</i>)				
FRAGOLA, LAMPONE	Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>)	Applicazioni primaverili-estive Dalla ripresa dello sviluppo vegetativo (BBCH 1) fino alla maturazione dei frutti (BBCH 89)	4-8 applicazioni fogliari ogni 5-14 giorni	Non previsto	
	Oidio (<i>Podosphaera aphanis</i>)				
	Peronospora (<i>Phytophthora fragariae</i>) altri funghi come <i>Colletotrichum acutatum</i>				
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)	BBCH 10-90	4-8 applicazioni fogliari ogni 5-14 giorni	Non previsto	
	Marciume nero (<i>Alternaria solani</i>)				
	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)				

* Scegliere l'appropriato volume di distribuzione per applicare il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie fogliare.
In caso di basso volume di impiego utilizzare l'equivalente di prodotto per un volume di 1000 l/ha.

VANTAGGI

- Contribuisce al controllo della peronospora se inserito in miscela e/o in strategia a prodotti fitosanitari specifici.
- Impiego autorizzato in agricoltura integrata e biologica.
- In strategia con il rame ne migliora le performance e permette il rispetto delle dosi autorizzate anno/ettaro.