


## **Vasco**<sup>®</sup>

**Insetticida-acaricida liquido a base di Abamectina autorizzato su un ampio spettro di colture.**

**Vasco**<sup>®</sup> è un insetticida-acaricida di derivazione naturale che agisce per contatto e ingestione. Penetra rapidamente con movimento translaminare formando una riserva attiva il cui deposito superficiale (prodotto non assorbito) si degrada alla luce solare quindi non interferisce con gli insetti utili. Persiste all'interno della vegetazione prolungando il periodo utile di attività. Controlla i parassiti su entrambe le pagine fogliari ed è attivo contro acari, eriofidi, minatrici, psilla.

COMPOSIZIONE	GRUPPO IRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Abamectina pura 1,89% (18 g/l)	3 A	Concentrato Emulsionabile (EC)	 <b>PERICOLO</b> Registrazione n°: 16492 del 24/11/2015



Flacone: 1 L  
Cartone: 12x1 L  
Pallet: 600 L



Tanica: 5 L  
Cartone: 4x5 L  
Pallet: 800 L

Visita  
la pagina  
prodotto!



**EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO**

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE		EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI	PHI (gg)
		ml/hl	l/ha			
ARANCIO, MANDARINO, CLEMENTINO, LIMONE	Minatrice serpentina	40	0,3-0,8	Alla comparsa delle prime mine sui getti nuovi in formazione	1-3 Ogni 7 gg	10
	Ragnetti rossi		0,4-0,8	Alla comparsa delle prime forme mobili dall'allegazione all'ingrossamento del frutto		
MELO	Ragnetti rossi	80	0,6-0,96	Da fine caduta dei fitofagi		
PERO	Psylla	50-100	0,375-1,2	A fine caduta petali o nelle generazioni successive alla comparsa delle prime neanidi.	1-2 Ogni 15 gg	3
	Ragnetti rossi	80	0,6-0,96			
PESCO	Ragnetti rossi	50-100	0,5-1,2	A fine caduta petali alla comparsa delle prime forme mobili	-	14
VITE DA VINO	Ragnetti rossi		0,25-1	Alla comparsa delle prime forme mobili	Non trattare durante la fioritura	10
VITE DA TAVOLA			0,5-1,2			
POMODORO (campo e serra)	Ragnetti rossi	50-100	0,15-1	Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione	1-3 Ogni 7 gg	3
	Minatrici fogliari					
POMODORO (serra)	Eriofide					
MELANZANA (campo e serra)	Ragnetto rosso	50-80	0,15-0,8	Alla comparsa delle prime forme mobili		3 serra 5 campo
MELONE, ZUCCA, COCOMERO* (campo e serra) CETRIOLO, CETRIOLINO, ZUCCHINO* (serra)	Ragnetto rosso	50-100	0,15-1	Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione	1-2 Ogni 7 gg	3
	Minatrici fogliari					
FRAGOLA* (serra)	Ragnetti rossi e gialli	50-100	0,15-1	Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione		3
	Minatrici fogliari					
LATTUGHE e INSALATE** (pieno campo) JUNCEA	Ragnetti rossi	50-100	0,15-1	Alla comparsa delle prime punture di ovodeposizione	1-3 Ogni 7 gg	7
	Minatrici fogliari					
MAIS	Ragnetti rossi	100	0,3-0,4	Alla comparsa delle prime forme mobili fino alla fase di 6° foglia distesa	1	-

\* Non trattare nel periodo invernale compreso tra Novembre e Febbraio

\*\* Escluse Crescione ed altri germogli e gemme, Barbarea, Rucola, Senape juncea

**VANTAGGI**

- Ampio spettro d'azione
- Nessuna resistenza incrociata con altri insetticidi e acaricidi
- Compatibile con altri prodotti in miscela.
- Rispetta insetti pronubi, antocoridi e fitoseidi.
- Ridotti tempi di carenza su pero, melo, melanzana, fragola, lattughe, vite e pomodoro.