

Plaza®

Erbicida selettivo per il mais, pomodoro e patata.

Plaza® è un erbicida selettivo non residuale di post-emergenza per mais, pomodoro e patata. È in grado di controllare efficacemente numerose graminacee annuali e perenni e diverse infestanti a foglia larga. Viene assorbito a livello fogliare e successivamente traslocato nei tessuti in accrescimento della pianta provocando l'arresto della crescita.

COMPOSIZIONE	CODICE HRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Rimsulfuron puro 25%	B	Granuli Idrodispersibili (WG)	 ATTENZIONE Registrazione n°: 16701 del 20/07/2016



Flaconcino: 0,1 Kg
 Cartone: 10x0,1 Kg
 Pallet: 144 Kg

Visita
 la pagina
 prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	INFESTANTI CONTROLLATE	EPOCA D'IMPIEGO	DOSE (g/ha)	PHI (gg)
MAIS	Infestanti sensibili: Amaranto (<i>Amaranthus spp.</i>) Centocchio comune (<i>Stellaria media</i>) Fienarola annuale (<i>Poa annua</i>) Giavane comune (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Gramigna comune (<i>Elytrigia repens</i>) Persicaria (<i>Poligonum persicaria</i>) Mediamente sensibili: Camomilla (<i>Matricaria chamomilla</i>) Erba morella (<i>Solanum nigrum</i>) Farinello comune (<i>Chenopodium album</i>) Portulaca (<i>Portulaca oleracea</i>) Viperina piantaginea (<i>Echium plantagineum</i>)	Prevalenza di graminacee: Applicare in post-emergenza della coltura entro la 4 ^a - 5 ^a foglia	Trattamento unico: 50	
		Prevalenza di infestanti a foglia larga: intervenire in post-emergenza precoce con 2 interventi a distanza di 8-15 gg	Trattamento frazionato: 30 + 20	
Prevalenza di <i>Solanum nigrum</i> : Applicare in post-trapianto della coltura entro la 3 ^a - 8 ^a foglia		Trattamento unico: 60		
Prevalenza di infestanti ad emergenza scalare e graminacee perenni: intervenire nella fase iniziale della coltivazione con due interventi a distanza di 8-15 gg		Trattamento frazionato: 60 + 40-50		
PATATA		Quando la coltura ha raggiunto i 10-20 cm	Trattamento unico: 60	
		Prevalenza di infestanti ad emergenza scalare: intervenire a partire nella fase di sviluppo dei germogli laterali	Trattamento frazionato: 60 + 30	

VANTAGGI

- Completamente selettivo per la coltura e ha una rapida degradazione nel suolo.
- Può essere miscelato con altri erbicidi per ampliare la gamma di infestanti controllate.
- Agisce inattivando la crescita dell'infestante entro poche ore dall'applicazione (il completo disseccamento avviene in due - tre settimane).