


||||| Drum®

Fungicida citotropico translaminare ad azione preventiva e curativa nei confronti delle peronosporacee che attaccano vite, orticole, tabacco e rosa.

Drum® è un fungicida attivo nei confronti delle peronosporacee che attaccano diverse colture. Svolge una duplice azione: per contatto nei confronti degli elementi di propagazione della peronospora (zoospore) ed endoterapica nei confronti del micelio che si sviluppa all'interno della lamina fogliare.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Cimoxanil puro 45%	27	Granuli Idrodispersibili (WG)	 ATTENZIONE Registrazione n°: 15084 del 07/06/2011



Scatola: 0,5 Kg
 Cartone: 20x0,5 Kg
 Pallet: 450 Kg

Visita
 la pagina
 prodotto!



EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE (g/hl)	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI / ANNO	PHI (gg)
VITE DA VINO VITE DA TAVOLA	Peronospora (<i>Plasmopara viticola</i>)	40-50	Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla sfioritura	-	10
		30-35	Dall'allegagione fino alla chiusura del grappolo		
CARCIOFO	Peronospora (<i>Bremia lctucae</i>)	40-50	Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla raccolta dei capolini	6	21
LATTUGA (campo e sementaio)			Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione	5	7
SPINACIO	Peronospora (<i>Peronospora farinosa</i>)		Trattare le piante quando ancora giovani; alla comparsa di sintomi	-	10
MELONE	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)		Dal post-trapianto fino allo stadio di giovane frutto	-	3
ZUCCHINA, CETRIOLO (serra)			Dal post-trapianto fino allo stadio di giovane frutto	5	
PISELLO (esclusi piselli da granella secchi e piselli con baccello)	Peronospora (<i>Peronospora pisi</i>)		Dallo stadio vegetativo fino alla fioritura	-	10
AGLIO, CIPOLLA	Peronospora (<i>Peronospora schleideni</i>)		Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione	4	7
PORRO	Peronospora (<i>Peronospora porri</i>)				
PATATA	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>)		Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla raccolta	6	10
POMODORO			Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione fino alla fruttificazione	-	
TABACCO	Peronospora (<i>Peronospora tabacina</i>)	Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione in tutti gli stadi di accrescimento	-	-	
ROSA	Peronospora (<i>Peronospora sparsa</i>)	Dal manifestarsi delle condizioni d'infezione	-	-	

VANTAGGI

- **Drum®** si caratterizza per la sua formulazione di qualità nell'ambito dei prodotti a base di cimoxanil al 45%.
- È un partner valido nella gestione delle malattie fungine nell'ambito di un programma di difesa basato su strategie anti-resistenza.

