

VEGAS 50 WG

FUNGICIDA in formulazione granuli idrodispersibili per la protezione di melo, pero, vite e olivo
Meccanismo d'azione: gruppo C (FRAC)

VEGAS 50 WG

Autorizzazione Ministero della Salute n 15986 del 30/11/2018

Composizione

Kresoxim-methyl puro g 50

Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H351 - Sospettato di provocare il cancro; H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;

EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze; P273 - Non disperdere nell'ambiente;

P280 - Indossare guanti e indumenti protettivi; P308 + P313 - In caso di esposizione o di possibile esposizione,

consultare un medico; P405 - Conservare sotto chiave; P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito; P501 - Smaltire

il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.



ASCENZA AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo – Herdade das Praias - 2910-440 Setubal – Portogallo

Tel +39 02 66101029

ATTENZIONE

Stabilimento di produzione: ASCENZA AGRO S.A. - Herdade das Praias – 2910-440, Setúbal (Portogallo)

Distribuito da: Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – Saronno (VA)

Taglia: 200, 600 g; 1, 5 kg

Partita n. vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

Durante le fasi di miscelazione/caricamento e applicazione del prodotto indossare guanti e indumenti protettivi. Dopo l'applicazione, non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazione di rifinitura manuale su vite prima che siano trascorsi due giorni dall'ultima applicazione del prodotto.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:

- 15 metri da corpi idrici superficiali per l'applicazione su meleti;
- 10 metri da corpi idrici superficiali per l'applicazione su vigneti e oliveti.

In alternativa, per proteggere gli organismi acquatici applicare tecniche di riduzione della deriva del 75%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Non indurre il vomito. Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

VEGAS 50 WG è un fungicida di copertura dotato di movimento traslaminare appartenente alla famiglia degli analoghi delle strobilurine. Il prodotto è particolarmente indicato per interventi preventivi su *Venturia pyrina* (Ticchiolatura) e *Stemphylium vesicarium* (Maculatura bruna) del Pero, *Venturia inaequalis* (Ticchiolatura) e *Podosphaera leucotricha* (oidio) del Melo, su *Uncinula necator* (Oidio) e *Guignardia bidwellii* (Marciume nero) della vite e su *Spilocaea oleaginea* (Occhio di pavone) dell'olivo.

Il prodotto è selettivo per gli organismi utili (api e artropodi) e non influenza le fermentazioni e le caratteristiche organolettiche dei vini.

MODALITA' DI IMPIEGO

Intervenire in presenza delle condizioni predisponenti la malattia, sempre in via preventiva e mantenendo gli intervalli applicativi consigliati.

Melo: contro Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*) e Oidio (*Podosphaera leucotricha*) intervenire in via preventiva a partire dalle fasi di maggiore suscettibilità e in presenza di condizioni favorevoli per la malattia. Primo intervento consigliato allo sviluppo delle infiorescenze alla dose di 200 g/ha, interventi successivi ogni 12-14 giorni. In caso di condizioni particolarmente avverse (elevata pressione della malattia, rapido sviluppo della nuova vegetazione) si consiglia di ridurre l'intervallo applicativo. In caso di pressione non elevata non

superare in ogni caso i 15 giorni di intervallo. Sono ammessi al massimo 3 interventi per stagione. Si consiglia di alternare VEGAS 50 WG con prodotti a differente meccanismo di azione. Impiegare volumi d'acqua sufficienti per garantire una ottimale copertura della vegetazione, in media compresi fra 800 e 1000 litri/ha. In ogni caso impiegare sempre la dose di prodotto consigliata per ettaro, indipendentemente dal volume di acqua impiegato.

Pero: contro Ticchiolatura (*Venturia pyrina*) e Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) intervenire in via preventiva a partire dalle fasi di maggiore suscettibilità e in presenza di condizioni favorevoli per la malattia. Primo intervento consigliato allo sviluppo delle infiorescenze alla dose di 200 g/ha, interventi successivi ogni 12-14 giorni. In caso di condizioni particolarmente avverse (elevata pressione della malattia, rapido sviluppo della nuova vegetazione) si consiglia di ridurre l'intervallo applicativo. In caso di pressione non elevata non superare in ogni caso i 15 giorni di intervallo. Sono ammessi al massimo 3 interventi per stagione. Si consiglia di alternare VEGAS 50 WG con prodotti a differente meccanismo di azione. Impiegare volumi d'acqua sufficienti per garantire una ottimale copertura della vegetazione, in media compresi fra 800 e 1000 litri/ha. In ogni caso impiegare sempre la dose di prodotto consigliata per ettaro, indipendentemente dal volume di acqua impiegato.

Vite: contro Oidio o Mal bianco (*Uncinula necator*) e Marciume nero o Black rot (*Guignardia bidwellii*) intervenire in via preventiva a partire dalle fasi di maggiore suscettibilità e in presenza di condizioni favorevoli per la malattia. In genere si consiglia di iniziare le applicazioni alla comparsa dei grappoli, quando la sensibilità ad entrambi i patogeni inizia ad aumentare, alla dose di 300 g/ha. Interventi successivi ogni 12-14 giorni. In caso di condizioni particolarmente avverse (elevata pressione della malattia, rapido sviluppo della nuova vegetazione) si consiglia di ridurre l'intervallo applicativo. In caso di pressione non elevata non superare in ogni caso i 15 giorni di intervallo. Sono ammessi al massimo 2 interventi per stagione contro Oidio o Mal bianco (*Uncinula necator*) e al massimo 3 interventi per stagione contro Marciume nero o black rot (*Guignardia bidwellii*). Si consiglia di alternare VEGAS 50 WG con prodotti a differente meccanismo di azione (Zolfo, Triazoli). Impiegare volumi d'acqua sufficienti per garantire una ottimale copertura della vegetazione, in media compresi fra 300 e 1000 litri/ha. In ogni caso impiegare sempre la dose di prodotto consigliata per ettaro, indipendentemente dal volume di acqua impiegato.

Olivo: contro Occhio di pavone (*Spillocaea oleaginea*) intervenire in primavera alla dose di 200 g/ha, interventi successivi ogni 14 giorni. Sono ammessi al massimo 2 interventi per stagione, dall'inizio dello sviluppo dei bottoni fiorali fino alla mignolatura. Impiegare volumi di acqua sufficienti per garantire una ottimale copertura della vegetazione, in media compresi fra 500 e 1000 litri/ha. In ogni caso impiegare sempre la dose di prodotto consigliata per ettaro, indipendentemente dal volume di acqua impiegato.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: prima di iniziare la preparazione della miscela assicurarsi che le attrezzature siano pulite e correttamente tarate per garantire la corretta bagnatura per ettaro. Riempire la botte di acqua per metà del suo volume e aggiungere direttamente il prodotto senza alcuna pre-diluizione. Completare il riempimento del serbatoio mantenendo l'agitatore in funzione.

TEMPI DI CARENZA: Interrompere le applicazioni 35 giorni prima della raccolta per Pero, Melo e Vite; per Olivo, non effettuare la raccolta prima dello stadio di piena maturazione.

GESTIONE DELLE RESISTENZE: per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare VEGAS 50 WG con prodotti aventi differente meccanismo d'azione. Su vite effettuare al massimo 4 trattamenti annui con prodotti inibitori della respirazione mitocondriale (Qol). Applicare il prodotto in via preventiva e preferibilmente in miscela con fungicidi a differente meccanismo d'azione.

AVVERTENZE

Seguire le principali strategie per prevenire l'insorgenza di resistenze: evitare l'uso ripetuto; alternare il prodotto con fungicidi aventi altre modalità di azione; evitare l'uso eradicante (prediligere le applicazioni preventive); seguire le dosi e gli intervalli consigliati; integrare con metodi non chimici; ove possibile combinare l'utilizzo di più strategie; non applicare più di tre volte per ogni stagione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Da non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.