IIIII Gat Tessla 25 WG®

Fungicida sistemico per susino, vite, zucchino, peperone, melone, carciofo, cereali e tappeti erbosi.

Gat Tessla® 25 WG è un fungicida sistemico a base Tebuconazolo in granuli idrodispersibili. Agisce in modo preventivo, curativo ed eradicante. Una volta assorbito, penetra rapidamente nei tessuti vegetali, questo permette di sfuggire all'azione dilavante delle pioggie e di proteggere la vegetazione sviluppatasi dopo il trattamento.

COMPOSIZIONE	CODICE FRAC	FORMULAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP
Tebuconazolo puro 25%	3 Gruppo G1	I Idrodispersibili (WG)	Registrazione n°: 14629 del 15/12/2010



Scatola: 1 Kg Cartone: 10x1 Kg Pallet: 300 Kg









EPOCA E CONDIZIONI DI IMPIEGO

COLTURA	AVVERSITÀ	DOSE	EPOCA D'IMPIEGO	N. TRATTAMENTI/ANNO	PHI (gg)
SUSINO	Monilia spp.	0,5-1,25	Trattamenti a cavallo della fioritura	2	7
	Botrytis cinerea		Trattamenti in pre-raccolta	2 ogni 7 gg	
	Mal bianco (Sphaerotheca pannosa)	kg/ha	-		
	Ruggine del susino	0,5-0,9 kg/ha	Trattamenti preventivi o alla comparsa dei primi sintomi della malattia	2	
VITE DA VINO	Oidio (Uncinula necator)	40 g/hl	-	3 ogni 10-14 gg	14
FRUMENTO DURO FRUMENTO TENERO	Mal del piede (Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis)	1 kg/ha	In fase di accestimento-levata		28
	Oidio (Erysiphe graminis) Ruggini (Puccinia spp.) Rincosporiosi (Rhynchosporium spp.) Elmintosporiosi Septoria(Septoria spp.)	1 kg/ha	Da inizio levata a spigatura	1	
	Fusariosi della spiga (Fusarium spp.)	1 kg/ha	In fase di piena fioritura		
ORZO	Mal del piede (Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis)		In fase di accestimento-levata	1	fine fioritura
	Oidio (Erysiphe graminis) Ruggini (Puccinia spp.) Rincosporiosi (Rhynchosporium spp.) Elmintosporiosi Septoria(Septoria spp.)	1 kg/ha	Da inizio levata a spigatura		
	Fusariosi della spiga (Fusarium spp.)		In fase di piena fioritura		
MELONE ZUCCHINO	O. I.	50 g/hl	-	4 Ogni 7-10 gg	3
PEPERONE CARCIOFO	Oidio		-	3 Ogni 7-10 gg	