

DELTASAP[®]

INSETTICIDA CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

DELTASAP



PERICOLO

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Deltametrina pura g 2,8 (= 25 g/l)

Coformulanti q.b.a g 100

Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica (pesante)

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato. H315 Provoca irritazione cutanea. H318 Provoca gravi lesioni oculari. H335 Può irritare le vie respiratorie. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare. P261 Evitare di respirare i vapori. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P370+P378 In caso d'incendio: utilizzare sostanze secche, anidride carbonica, schiuma o polvere secca per estinguere. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla normativa vigente.

ASCENZA Agro S.A. Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias
2910-440 Setúbal – Portogallo Tel. +39 02 84944669

Stabilimento di produzione:

ASCENZA Agro S.A. Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias 2910-440 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di confezionamento:

DIACHEM S.p.A. - 24043 Caravaggio (BG) - Via Mozzanica, 9/11

SCAM S.p.A. - Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena

Stabilimento di Ri-etichettatura: Arco Logistica S.r.l. - Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

Registrazione Ministero della Salute n° 15402 del 10/05/2012

Distributore: Ascenza Italia S.r.l. – Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA) – Tel 0284944669

Taglie autorizzate: 250 ml; 1-3-5 litri

Partita n°: vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici è indispensabile:

- una fascia di rispetto di 10 metri quando si tratta il melo. 20 metri quando si tratta l'olivo e 20 metri dai corpi idrici superficiali con fascia di rispetto vegetata quando si trattano colture erbacee.
- per la protezione degli artropodi non target osservare una fascia di rispetto di 5 metri dai terreni non coltivati.
- pericoloso per le api. Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non applicare alle colture al momento della fioritura. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. il prodotto è nocivo per gli insetti utili.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia, sintomatica e di rianimazione.

N B diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopneumoniti chimiche, aritmie cardiache.

Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

DELTASAP è un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attività contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Frutticoltura: (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro psilla 75 ml/hl (1 l/ha), afide verde del melo, afide del pesco, *Cydia pomonella*, afidi della frutta, lepidotteri e coleotteri 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.

Frutticoltura: (pero) contro psilla 75 ml/hl (max 0,7 l/ha), afide verde del melo, afide del pesco, *Cydia pomonella*, afidi della frutta, lepidotteri e coleotteri 30-50 ml/hl (0,3-0,7 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.

Viticultura: contro tignole 40-60 ml/hl (0,4-0,7 l/ha), cicaline 30-50 ml/hl (0,3-0,6 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.

Olivicoltura: contro tignola (*Prays oleae*) e mosca delle olive 40-60 ml/hl (0,4-0,9 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.

Orticoltura (pieno campo) - cavolfiori, broccoli, cavoletti di Bruxelles: contro lepidotteri, cavolaia e nottue 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha), afidi 50 ml/hl (0,5 l/ha). Effettuare al massimo 2 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.

Orticoltura (pieno campo) - zucchini, patata: contro dorifora della patata, lepidotteri, cavolaia e nottue 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha), afidi 50 ml/hl (0,5 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.

Orticoltura (pieno campo e serra) - lattughe e insalate (esclusa la scarola e le baby leaf di cicoria, di spinacio e di bietola da foglia), pomodoro: contro lepidotteri, cavolaia e nottue 30-50 ml/hl (0,3-0,5 l/ha), afidi ml 50/hl (0,5 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni in pieno campo e al massimo 2 trattamenti a distanza di 7 giorni in serra.

Cereali: su mais (trattamenti primaverili-estivi) contro nottue 0,3 l/ha, piralide e diabrotica 0,5 l/ha; su **altri cereali** tranne il riso (trattamenti primaverili-estivi) contro lepidotteri e afidi 0,3 l/ha. Effettuare al massimo 3 trattamenti ad intervallo di 14 giorni.

Nocciolo: contro afidi 50 ml/hl (0,5 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti a distanza ad intervallo di 14 giorni.

Colture ornamentali in campo: contro afidi 50 ml/hl (0,5 l/ha). Effettuare al massimo 3 trattamenti a distanza ad intervallo di 14 giorni.

Diluire la dose indicata di DELTASAP in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.

DELTASAP agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di un opportuno Bagnante Adesivante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

COMPATIBILITÀ

DELTASAP non è miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione acida/alcalina. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile è necessario aggiungere la dose di prodotto preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI:

- 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su **CEREALI (escluso mais)**
- 14 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su **LATTUGHE IN SERRA**
- 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su **LATTUGHE IN PIENO CAMPO**
- 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su **OLIVE, PATATA, MELO, PERO, CAVOLFIORI, BROCCOLI E CAVOLETTI DI BRUXELLES, SUSINO, CILIEGIO**
- 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su **INSALATE** (escluse le lattughe, la scarola e le baby leaf di cicoria, di spinacio e di bietola da foglia) **IN SERRA.**
- 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO su **INSALATE** (escluse le lattughe, la scarola e le baby leaf di cicoria, di spinacio e di bietola da foglia) **IN PIENO CAMPO** e su **TUTTE LE ALTRE COLTURE.**

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATI