

FOLPEC 50 SC

FUNGICIDA LIQUIDO SOTTO FORMA DI
SOSPENSIONE CONCENTRATA

FOLPEC 50 SC

Autorizzazione Ministero della Salute n. 13714 del 9/11/2007

Composizione

g 100 di prodotto contengono:

FOLPET puro g 40 (g/l 500)

Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini; P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso; P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso. P301 IN CASO DI INGESTIONE: consultare immediatamente un medico; P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito; P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo con la regolamentazione nazionale.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Ascenza AGRO S.A.

Avenida do Rio Tejo - Herdade das Praias

2910-440 Setúbal - Portogallo

Tel. +39 02 84944669

Stabilimento di produzione:

Ascenza AGRO S.A., Herdade das Praias – 2910 Setúbal – Portogallo

Stabilimento di rietchettatura: Arco Logistica Srl Via Antonio Battistella22, 44123 - Ferrara (FE)**Distribuito da** Ascenza Italia S.r.l., via Varese 25/G 21047 Saronno(VA) tel 02-84944669

Taglia: 200-250-500 ml; 1-5-10-15-20 l

Partita n.: vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Adoperare a una distanza non inferiore a 10 m dai corpi idrici per vite e pomodoro da consumo fresco, a una distanza non inferiore a 3 m per pomodoro da industria.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica.

Avvertenza: consultare un centro antiveleni.



ATTENZIONE

MODALITÀ D'IMPIEGO

Caratteristiche

Il prodotto ha un'azione preventiva nei confronti della peronospora e botrite ed un'azione collaterale nell'oidio della vite.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ D'IMPIEGO

Vite (da vino):

Phomopsis: viticola (escoriosi): 2 trattamenti allo stadio di 7-8 foglie, a partire dal germogliamento e dopo circa 1 settimana) a 0,5-1,5 L/hL con un massimo di 3 L/ha per trattamento.

Peronospera: applicare quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia fino a 28 giorni prima della raccolta a 0,2-2 L/hL con un massimo di 2 L/ha per trattamento.

Massimo 10 applicazioni complessive per stagione.

Pomodoro (in campo):

Alternaria spp. (alternariosi), *Fulvia fulva* (cladosporiosi), *Colletotrichum coccodes* (antracnosi), *Septoria lycopersici* (septoriosi), *Botrytis cinerea* (muffa grigia): effettuare un massimo di 4 trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta a 0,25-0,5 L/hL con un massimo di 2,5 L/ha per trattamento.

Pomodoro (in serra):

Alternaria spp. (alternariosi), *Fulvia fulva* (cladosporiosi), *Colletotrichum coccodes* (antracnosi), *Septoria lycopersici* (septoriosi), *Botrytis cinerea* (muffa grigia): effettuare un massimo di 3 trattamenti dallo stadio di 3-4 foglie fino a 7 giorni prima della raccolta a 0,25-0,32 L/hL con un massimo di 3,2 L/ha per trattamento.

Preparazione della miscela acquosa: versare direttamente la quantità necessaria di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice, mantenendo l'acqua in agitazione.

N.B. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è miscibile con Poltiglia bordolese, Polisolfuro e Olio bianco.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Devono trascorrere 20 giorni da un'applicazione con olii minerali e prodotti a base di zolfo.

RISCHI DI NOCIVITÀ - Il prodotto è tossico per gli insetti utili ed i pesci.

INTERVALLO DI SICUREZZA

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta per la vite e 7 giorni prima della raccolta del pomodoro.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO