

# TERVANT

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Insetticida sistemico per il controllo delle principali specie di afidi che attaccano le colture di agrumi, melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchini e per il controllo della mosca bianca su pomodoro e cucurbitacee  
MECCANISMO D'AZIONE IRAC 29

**Composizione:**

FLONICAMID puro g. 50

Coformulanti q.b. a g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO:****H319** Provoca grave irritazione oculare.**H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**CONSIGLI DI PRUDENZA:****P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.**PREVENZIONE: P264** Lavare

accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso.

**P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.**REAZIONE: P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.**CONSERVAZIONE: P401** Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**SMALTIMENTO: P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente.**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:****EUH208** Contiene malato di sodio (371-47-1). Può provocare una reazione allergica. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**Autorizzazione Ministero della Salute n. 18842 del 23/12/2024****Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.**

Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº3, 2th Floor - 30006 Murcia, Spagna - Tel. 02 3604 2884

**Stabilimenti di produzione:****Solfotecnica Italiana S.p.A.** Via Giacomo Matteotti, 16 – 48123 Ravenna, Italy**Shandong Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd.** Economic Development Zone, Boxing County, Shandong Province, 256500, China**Distributore:****ASCENZA Italia S.r.l.** Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)  
Tel +39 0284 944669

Contenuto 0,010-0,020-0,050-0,100-0,140-0,250-0,500-1-2-5 Kg

Partita n° ....

**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Moderatamente tossico per le api. Per proteggere le api e gli altri impollinatori non applicare in fioritura. Non applicare quando le api sono in attività. Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore. In serra: per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori non usare il prodotto dove le api sono in attività. In caso di raccolta manuale a meno di 14 giorni dal trattamento, utilizzare guanti adatti.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveneni.**CARATTERISTICHE**

**TERVANT** è un insetticida sistemico specifico per il controllo degli afidi che attaccano le colture di **agrumi, melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchini** (in pieno campo e in serra) e per il controllo della mosca bianca su **orticole (pomodoro e cucurbitacee)**.

**COLTURE, PARASSITI CONTROLLATI, DOSI ED EPOCHE D'IMPIEGO****Agrumi**

Contro afide verde degli agrumi (*Aphis citricola*), afide bruno degli agrumi (*Toxoptera aurantii*), afide verde del pesco (*Myzus persicae*), afide delle malvacee e delle cucurbitacee (*Aphis gossypii*), intervenire all'inizio dell'infestazione, in genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli alla dose di 0,1 Kg/ha, distribuiti con volumi d'acqua di 1000-2000 L di acqua per ha corrispondenti a 5-10 g/hl. Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 2 per anno) a distanza di 14 giorni.

**Melo e Pero**

Contro afide grigio del melo (*Dysaphis plantaginea*), afide verde del melo (*Aphis pomi*) e afide grigio del pero (*Dysaphis pyri*) intervenire alla comparsa dell'infestazione, in genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12- 0,14 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 200-1000 L/ha (eccezionalmente 1500 L/ha) a seconda del tipo di coltura, dello stadio di sviluppo e dell'attrezzatura di distribuzione impiegata.

Si raccomanda di utilizzare la dose più elevata (0,14 Kg/ha) per il controllo dell'afide grigio del melo.

Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

**Pesco e Susino**

Contro afide verde del pesco (*Myzus persicae*), *Brachycaudus helichrysi* ed afide farinoso del susino (*Hyalopterus pruni*) intervenire alla comparsa dell'infestazione, in genere all'inizio della primavera quando si sviluppano i primi germogli, alla dose di 0,12- 0,14 Kg/ha in funzione della severità dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utilizzare volumi d'acqua di 200-1000 L/ha (eccezionalmente 1500 L/ha) a seconda del tipo di coltura, dello stadio di sviluppo e dell'attrezzatura di distribuzione impiegata.

Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 2 per anno) a distanza di 14-21 giorni.

**Pomodoro (in campo e in serra)**

Contro afidi (*Myzus persicae* e *Aphis gossypii*) intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particolare in serra quando più del 5% delle foglie sono infestate da uno o più individui), alla dose di 0,10-0,12 Kg/ha in funzione della severità dell'attacco; per infestazioni iniziali impiegare la dose più bassa. Utilizzare volumi d'acqua di 400- 1000 L/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione. Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14giorni.

**Cucurbitacee (melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca, zucchini) sia in campo che in serra:** contro afidi (*Aphis gossypii*) intervenire alla comparsa dell'infestazione (in particolare in serra quando più del 5% delle foglie sono infestate da uno o più individui), alla dose di 0,10 Kg/ha. Utilizzare volumi d'acqua di 400-1000 L/ha a seconda dello sviluppo della vegetazione. Ripetere i trattamenti (fino ad un massimo di 3 per anno) a distanza di 7-14 giorni.

**Su orticole (pomodoro e cucurbitacee)** il prodotto può essere applicato anche tramite il sistema dell'irrigazione a goccia o con manichette per il controllo della mosca bianca (*Trialeurodes vaporariorum* e *Bemisia tabaci*) in particolare le forme immature. TERVANT, dopo essere stato disciolto in poca acqua a parte, viene introdotto nel sistema di irrigazione e quindi distribuito al terreno. La soluzione deve essere preparata subito prima del trattamento e applicata al termine del ciclo di irrigazione.

Si raccomanda di effettuare 2 trattamenti alla dose di 0,20 kg/ha, il primo dopo che le piantine abbiano superato la crisi di trapianto (da 1 a max 7 giorni) e il secondo a 10- 14 giorni di distanza, a seconda delle condizioni favorevoli allo sviluppo della mosca bianca.

**Avvertenza agronomica:** Non effettuare più di 3 applicazioni per anno. Pertanto, qualora TERVANT venga impiegato per il controllo della mosca bianca mediante il sistema dell'irrigazione a goccia o con manichetta (max 2 applicazioni), si raccomanda di effettuare un solo trattamento per irrorazione fogliare (controllo degli afidi) in modo tale da non superare le 3 applicazioni totali per anno.

**Il numero massimo di trattamenti effettuati per anno con i prodotti a base di Flonicamid non deve superare il numero massimo di trattamenti indicati in etichetta di uno dei prodotti a base della sostanza attiva.**

**PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE**

Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua, mettere in funzione l'agitatore ed aggiungere la dose prevista di prodotto, quindi portare al volume desiderato aggiungendo altra acqua. Mantenere la massa in agitazione fino all'applicazione.

**COMPATIBILITÀ**

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta su POMODORO, MELONE, CETRIOLO, CETRIOLINO, COCOMERO, ZUCCA E ZUCCHINO, 14 giorni su PESCO, 21 giorni su MELO e PERO, 35 giorni su SUSINO, 60 giorni su AGRUMI.**

**ATTENZIONE**

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E AL RIPARO DALL'UMIDITÀ  
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI  
D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

# TERVANT

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

Insetticida sistemico per il controllo delle principali specie di afidi che attaccano le colture di agrumi, melo, pero, pesco, susino, pomodoro, melone, cetriolo, cetriolino, cocomero, zucca e zucchino e per il controllo della mosca bianca su pomodoro e cucurbitacee

MECCANISMO D'AZIONE IRAC 29

Composizione:  
FLONICAMID puro g. 50  
Coformulanti q.b. a g. 100



**INDICAZIONI DI PERICOLO:**

**H319** Provoca grave irritazione oculare.

**H412** Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:**

**P102** Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**ATTENZIONE**

**PREVENZIONE: P264** Lavare

accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso.

**P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P273** Non disperdere nell'ambiente. **P280** Indossare guanti e indumenti protettivi. Proteggere gli occhi e il viso.

**REAZIONE: P305+P351+P338** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P337+P313** Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

**CONSERVAZIONE: P401** Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**SMALTIMENTO: P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionali vigente.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:**

**EUH208** Contiene malato di sodio (371-47-1). Può provocare una reazione allergica. **EUH401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Autorizzazione Ministero della Salute n. 18842 del 23/12/2024**

**Titolare dell'autorizzazione: Sharda Cropchem España S.L.**  
Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº3, 2th Floor  
- 30006 Murcia, Spagna - Tel. 02 3604 2884

**Stabilimenti di produzione:**

**Solfotecnica Italiana S.p.A.** Via Giacomo Matteotti, 16 – 48123  
Ravenna, Italy

**Shandong Jingbo Agrochemicals Technology Co., Ltd.**  
Economic Development Zone, Boxing County, Shandong Province,  
256500, China

**Distributore:**

**ASCENZA Italia S.r.l.** Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)  
Tel +39 0284 944669

Contenuto 10-20-50-100 g

Partita n° ....

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**  
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE**  
**ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**