

MELVAR START

Fungicida sistemico per cereali

Sospensione concentrata (SC)

Protiokonazolo FRAC 3 gruppo G1; Folpet FRAC M4

MELVAR START

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 18909 del 31/01/2025

Composizione

Protiokonazolo puro 120 g/l

Folpet 300 g/l

Coformulanti q.b. a g 100

Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso. P308+P313 In caso di esposizione o di temuta esposizione, consultare un medico. P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. P411 Conservare a temperature non superiori a 40 °C. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

ASCENZA Italia S.r.l.

Via Varese 25/G – 21047 Saronno (VA)

Tel: +39 0284944669

Stabilimento di produzione: ASCENZA AGRO S.A. – Herdade das Praias – 2910-440 Setubal (Portogallo)

Stabilimento di Ri-etichettatura: Arco Logistica S.r.l con sede in Via Monari, 5 44124 - Ferrara (FE) e Via Antonio Battistella, 22 - 44123 Ferrara

Taglia: 1 - 5 - 10 - 20 l

Partita vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici mantenere una fascia di rispetto dalle acque superficiali vegetata non trattata di 20 m (VFS) per applicazioni su cereali primaverili e invernali

Indossare guanti e indumenti da lavoro che coprano interamente braccia e gambe e una protezione per viso/occhi durante le operazioni di miscelazione, caricamento e applicazione della miscela.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione risulti completamente asciutta e utilizzare guanti e tuta intera da lavoro in caso di rientro per eventuali attività agricole.

Per la protezione di residenti e astanti rispettare una buffer zone di 5 m da zone residenziali e di passaggio.

L'accesso ai campi trattati dovrebbe essere interdetto ai non addetti ai lavori.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

MELVAR START è un fungicida con una doppia azione sistemica e di contatto. Il Protiokonazolo agisce inibendo la demetilazione sistemica (DMI) indebolendo le pareti cellulari dei patogeni; Folpet, resistente al dilavamento grazie alla sua forte aderenza alle cere della coltura, supporta con la sua azione multi-sito.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Frumento (tenero e duro)

Contro: Septoriosi (*Septoria sp.*)

Applicare alla dose di 1 – 1,5 l/ha utilizzando 150-400 l acqua/ha posizionando 2 interventi (con intervallo di 14 giorni) tra la fase di allungamento del fusto quando il secondo nodo almeno 2 cm sopra il primo nodo e la fase di fioritura (BBCH 32-61)

Orzo

Contro: Elmintosporiosi (*Helminthosporium spp.*)

Applicare alla dose di 1 – 1,5 l/ha utilizzando 150-400 l acqua/ha posizionando 2 interventi (con intervallo di 14 giorni) tra l'inizio della fase di allungamento del fusto e la fase di fioritura (BBCH 30-61)

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri formulati, effettuare preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di miscela con altri formulati devono essere osservati i tempi di carenza più lunghi. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

GESTIONE DELLE RESISTENZE

Per evitare l'insorgere di fenomeni di resistenza attenersi alle indicazioni riportate in etichetta e alternare MELVAR START a prodotti aventi differente meccanismo d'azione. L'applicazione ripetuta da sola non deve essere ripetuta sulla stessa coltura contro un agente patogeno ad alto rischio. Le miscele o l'alternanza con fungicidi aventi una diversa modalità di azione hanno dimostrato efficacia contro lo sviluppo di forme resistenti di malattia. Per evitare lo sviluppo di resistenza, applicare il prodotto in modo protettivo in risposta alle previsioni sulla malattia. Monitorare con attenzione la presenza di ceppi sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare il rivenditore e le autorità competenti (Servizio Fitosanitario di riferimento) in caso di sospetta resistenza.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.